

PRAXIS DR. BOEKSTEGERS IN DEN PRAXEN AM THEATER

INNERE MEDIZIN • ALLGEMEINMEDIZIN
GASTROENTEROLOGIE • PROKTOLOGIE
STRAHLENSCHUTZERM. ARZT NRW
DERMATOLOGIE • ALLERGOLOGIE
KOSMETOLOGIE • ANÄSTHESIOLOGIE

PG AM GRILLO-THEATER, ERSTER HAGEN 26, 45127 ESSEN

Infoblatt Impfung Engerix-B Erwachsene

Anwendungsgebiete:

Zur aktiven Immunisierung gegen Hepatitis B, verursacht durch Viren aller bekannten Subtypen. Die Immunisierung mit Engerix-B Erwachsene kann auch die Entstehung der Hepatitis D verhindern, da diese (durch Delta-Antigen verursachte) Erkrankung nur bei gleichzeitig bestehender Hepatitis-B-Infektion auftritt.

Personen mit einem erhöhten Hepatitis-B-Infektionsrisiko sind u. a.:

- Angehörige der verschiedenen medizinischen Berufsgruppen (Ärzte, Zahnärzte, Pflegepersonal, medizinisches Assistenz- und Laborpersonal, Hebammen und Geburtshelfer, Sanitäter, Auszubildende im medizinischen Bereich);
- Dialysepatienten, Patienten, bei denen wiederholt Bluttransfusionen sowie Injektionen oder Infusionen mit Blutderivaten (z.B. bei Hämophilie, Thalassämie, Sichelzellanämie, Zirrhose) vorgenommen werden, sowie seronegative Transplantatempfänger;
- Kontaktpersonen von mit Hepatitis-B-Virus infizierten Personen;
- Personal und Bewohner von Heimen und geschlossenen Anstalten;
- Rauschgiftsüchtige und deren Betreuer;
- Personen mit häufigem Intimpartnerwechsel;
- Homosexuelle;
- Personen, die in Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko reisen oder sich dort aufhalten.

Bedingt durch die lange Inkubationszeit der Hepatitis-B-Infektion ist es möglich, dass eine unerkannte Infektion bereits zum Zeitpunkt der Impfung vorliegt. Die Impfung nach bereits erfolgter Infektion kann eine klinische Hepatitis B nicht verhindern.

Gegenanzeigen:

In welchen Fällen darf Engerix-B Erwachsene nicht angewendet werden? Engerix-B Erwachsene sollte nicht bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen eine der im Impfstoff enthaltenen Substanzen verabreicht werden und ebenfalls nicht Personen, die nach vorangegangener Engerix-B-Impfung Zeichen einer Überempfindlichkeit gezeigt haben. Wie bei allen anderen Impfstoffen sollte auch bei Engerix-B Erwachsene die Impfung im Falle einer akuten mit Fieber einher gehenden Erkrankung aufgeschoben werden. Leichte Infekte stellen hingegen keine Gegenanzeige für eine Impfung dar.

Wechselwirkungen:

Welche anderen Substanzen oder Medikamente beeinflussen die Wirkung von Engerix-B Erwachsene oder werden in ihrer Wirkung durch Engerix-B Erwachsene beeinflusst?

Die gleichzeitige Gabe von Engerix-B Erwachsene und eine Standarddosis Hepatitis-B-Immunglobulin (HBIG) beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit der Impfung, sofern verschiedene Injektionsstellen verwendet werden.

Bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie oder mit beeinträchtigter Immunantwort kann der Impferfolg eingeschränkt sein oder ausbleiben.

Warnhinweise:

Keine.

Zur Kenntnis genommen:

Datum: Unterschrift:



PRAXENGEMEINSCHAFT
HAUS AM THEATER
I. HAGEN 26
45127 ESSEN-ZENTRUM

DR. MED. A. BOEKSTEGERS
FACHARZT F. INNERE MEDIZIN
GASTROENTEROLOGIE
PROKTOLOGIE
STRAHLENSCHUTZARZT
NRW

E. DESCHER
FACHÄRZTIN F. INNERE MEDIZIN
FACHKUNDE KOLOSKOPIE

DR. MED. S. BERGUNDE
FACHARZT F. ANÄSTHESIOLOGIE
SPEZ. ANÄSTH. INTENS.MEDIZIN
AKUPUNKTUR, TCM

DR. MED. A. SCHOLZ
FACHÄRZTIN F. INNERE MEDIZIN

**DR: MED.
B. SEIDLITZ-FEHLINGS**
FACHÄRZTIN F. INNERE MEDIZIN

H.H. BLETTGEN **
PFARRER i.R.
LEBENSBERATUNG

** nur Privatmedizin

TELEFON 0201/ 827 200
TELEFAX 0201/ 827 20 26
WWW.DR-BOEKSTEGERS.DE

DR. MED. E. PIERCHALLA
PRAKTISCHE ÄRZTIN

TELEFON 0201/ 827 20 20

**DR. MED. E. SUNDER-
PLABMANN**
FACHÄRZTIN F. DERMATOLOGIE
ALLERGOLOGIE
MED.-DERM. KOSMETOLOGIE

TELEFON 0201/ 23 70 41

24-STUNDEN-REZEPT-
HOTLINE
0201/ 8272055